

# & PSYCHIATRIE PSYCHIATRY & PSYCHOBIOLOGY PSYCHOBIOLOGIE

VOL. 4/No. 5

1989

ISSN 0767-399 X  
SCSPED II (1) 255-334  
PPSYEU (4) (5)

**Rédacteurs en chef:** P. BOYER, Paris/Sainte-Anne, J.D. GUELFY, Paris/Sainte-Anne, Y. LECRUBIER, Paris/Salpêtrière

#### Rédacteurs associés

##### *Psychopathologie*

J. ADES, Paris/Colombes  
H.S. AKISKAL, Memphis, TN  
J. DALERY, Lyon  
R. KLEIN-GITTELMAN, New York  
H. KATSCHNIG, Vienne  
R. LEVY, Londres  
H.G. POPE, Belmont, MA  
W. REIN, Tübingen

##### *Diagnostic et classification*

N. MOMBOUR, Munich  
C.B. PULL, Luxembourg  
N. SARTORIUS, Genève  
R.L. SPITZER, New York

##### *Psychobiologie*

M. ACKENHEIL, Munich

P. BAUMANN, Lausanne  
J.-P. BOULENGER, Caen  
D. KEMALI, Naples  
P. LEMOINE, Lyon/Bron

##### *Psychothérapie*

A. BRACONNIER, Paris  
S. CONSOLI, Paris  
P. JEAMMET, Paris  
C. PERRIS, Úmea  
I. MARKS, Londres

##### *Chimiothérapie*

G. CASSANO, Pise  
J.A. COSTA E SILVA, Rio de Janeiro  
D. GINESTET, Paris/Villejuif  
G. SEDVALL, Stockholm  
R. TAKAHASHI, Tokyo †  
A. VILLENEUVE, Beaufort/Québec

##### *Psychopharmacologie clinique*

J.M. DANION, Strasbourg  
S.Z. LANGER, Paris  
A.J. PUECH, Paris  
T.W. ROBBINS, Cambridge, U.K.

##### *Comportement animal et pharmacologie*

J. COSTENTIN, Rouen  
Ph. SOUBRIE, Montpellier

##### *Neuropsychologie*

M. de BONIS, Paris/Kremlin-Bicêtre  
J.A. GRAY, Londres

##### *Epidémiologie et Analyse des données*


J. FERMANIAN, Paris  
R. von FRENCKELL, Liège  
J. LELLOUCH, Paris/Villejuif  
J.P. LÉPINE, Paris  
F. ROUILLON, Paris/Colombes

#### Comité Scientifique

N.C. ANDREASEN, Iowa City, IO  
M. ASBERG, Stockholm  
J.L. AYUSO, Madrid  
T.A. BAN, Nashville, TN  
P. BERNER, Vienne  
D. BOBON, Liège  
M. BOURGEOIS, Bordeaux  
M. CASAS, Barcelone  
J. COTTRAUX, Lyon  
R. DANTZER, Bordeaux

H. DUFOUR, Marseille  
A. FELINE, Paris/Kremlin-Bicêtre  
J. GLOWINSKI, Paris  
C. KORDON, Paris  
S. LEBOVICI, Paris  
M. LE MOAL, Bordeaux  
T. LEMPERIERE, Paris/Colombes  
H. LOO, Paris  
J.J. LOPEZ IBOR, Madrid

J. MENDLEWICZ, Bruxelles  
J. PELLET, Saint-Etienne  
P. PICHOT, Paris  
D. SCHALLING, Stockholm  
J.C. SCHWARTZ, Paris  
P. SIMON, Paris  
L. SINGER, Strasbourg  
D. WIDLOCHER, Paris  
E. ZARIFIAN, Caen



ELSEVIER

# FLUANXOL

(flupentixol)

Une gamme  
neuroleptique  
polyvalente

**PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES :** Neuroleptique incisif, famille des thioxanthènes. **SORT DU MÉDICAMENT :** - **FLUANXOL solution buvable :** ● concentration sérique maximum atteinte entre 3 et 8 heures après l'injection. ● temps de 1/2 vie sérique de 24 heures environ chez l'adulte. - **FLUANXOL L.P. 20 mg/ml et L.P. 100 mg/ml :** ● concentration sérique maximum atteinte entre les 11<sup>e</sup> et 17<sup>e</sup> jours après l'injection. - Commun aux deux formes : ● le flupentixol est dégradé par sulfoxydation et désalkylation. ● l'excrétion biliaire importante traduit une circulation antéro-hépatique intense. ● l'élimination fécale est cinq fois plus importante que l'élimination urinaire. **PRÉSENTATIONS :** - **FLUANXOL solution buvable à 4 % (flupentixol dichlorhydrate)** : Flacon compte-gouttes de 10 ml. - **FLUANXOL L.P. 20 mg/ml (flupentixol décanoate)** : Soluté injectable I.M. à action prolongée. Boîte de 4 ampoules de 1 ml. - **FLUANXOL L.P. 100 mg/ml (flupentixol décanoate)** : Soluté injectable I.M. à action prolongée. Boîte de 1 ampoule de 1 ml. **INDICATIONS :** Syndromes psychotiques aigus ou chroniques. **CONTRE-INDICATIONS :** ● Risque de glaucome par fermeture de l'angle. ● Risque de rétention urinaire liée à des troubles uréthro-prostatiques. Contre-indications, associations déconseillées : alcool, lévodopa. **MISE EN GARDE :** Syndrome malin. Tout traitement neuroleptique doit être suspendu en cas de survenue d'une hyperthermie, celle-ci pouvant être un des éléments du syndrome malin (pâleur, hyperthermie, troubles végétatifs) décrit avec les neuroleptiques. **EFFETS INDESIRABLES ET INTERACTIONS :** Ceux de la plupart des neuroleptiques : effets neurologiques, végétatifs, endocriniens et métaboliques. Se reporter aux monographies figurant dans le dictionnaire des spécialités pharmaceutiques. **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :** ● L'absorption des boissons alcoolisées est fortement déconseillée pendant le traitement. ● Surveillance renforcée chez les épileptiques (possibilité d'abaissement du seuil épileptogène). ● Utilisation avec prudence chez les parkinsoniens nécessitant un traitement neuroleptique. **PRUDENCE :** ● Chez les sujets âgés, en raison de leur importante sensibilité (sédation et hypotension). ● Dans les affections cardio-vasculaires graves, en raison des modifications hémodynamiques, en particulier l'hypotension. ● Dans les insuffisances rénale et hépatique en raison du risque de surdosage. **GROSSESSE :** Bien qu'aucun effet tératogène n'ait été mis en évidence chez l'animal, le **FLUANXOL** oral ou injectable L.P., comme tout neuroleptique, est à utiliser avec prudence et sous surveillance stricte chez la femme

enceinte. **UTILISATION DE LA FORME INJECTABLE L.P. :** Avant d'insérer le patient dans un traitement par **FLUANXOL L.P.**, il est utile de tester le sensibilité du patient avec le **FLUANXOL soluté buvable**. **MODE D'EMPLOI :** **POSOLOGIE :** - **FLUANXOL solution buvable :** Posologie strictement individuelle, en fonction du tableau clinique : ● effet antipsychotique et anti-hallucino-gène : 20 à 80 mg/jour, éventuellement jusqu'à 120 mg/jour en milieu hospitalier. - **FLUANXOL L.P. :** Voie I.M. profonde, souvent utilisé en relais du traitement neuroleptique par voie orale. ● effet antipsychotique et désinhibiteur : de 20 à 80 mg toutes les 3 semaines. ● effet antidépressif et anti-hallucino-gène : de 80 à 300 mg toutes les 2 à 3 semaines. **CHEZ LES SUJETS AGÉS, LES ÉPILEPTIQUES :** posologie réduite à la moitié ou au quart de la posologie mentionnée ci-dessus. **DOSAGE :** ● Syndrome parkinsonien gravissime, coma. ● Traitement de maintenance en milieu spécialisé. **TABLEAU A. FLUANXOL solution buvable :** sur le marché en 1975. A.M.M. : 316.555.2. **FLUANXOL L.P. 20 mg/ml :** 318.096.5 Amp. 1 ml. Mis sur le marché en 1976. **FLUANXOL L.P. 100 mg/ml :** A.M.M. : 326.349.6 Amp. 1 ml. Mis sur le marché en 1985. **PRIX :** **FLUANXOL sol. buv. :** 49,90 F + S.H.P. (flacon de 10 ml). **FLUANXOL L.P. 20 mg/ml :** 1 ml : 56,60 F + S.H.P. (boîte de 4). **FLUANXOL L.P. 100 mg/ml :** 1 ml : 57,80 F + S.H.P. (boîte unitaire). Remb. Sec. Soc. à 70 % Collect.

Laboratoires CLIN MIDY

32-34, rue Marbeuf

75008 PARIS

Tel. : 40.73.40.73



**sanc**  
CLIN MIDY

# PSYCHIATRIE & PSYCHOBIOLOGIE

## PSYCHIATRY & PSYCHOBIOLOGY

### OBJECTIFS

L'objectif de *Psychiatrie & Psychobiologie* est de publier les résultats de travaux originaux dans les domaines qui intéressent, à l'heure actuelle, la Psychiatrie tels que: psychopathologie, nosographie, chimiothérapie, psychothérapie, méthodologie des essais cliniques, perturbations biologiques et pathologie mentale, psychophysiologie, neuropsychologie, comportement animal.

Cet objectif large mais centré sur la publication d'articles originaux est destiné à:

- 1) faciliter la circulation des idées et des travaux au sein des pays européens,
  - 2) permettre une meilleure connaissance mutuelle des évolutions survenant dans la communauté psychiatrique internationale.
- Les communications brèves seront publiées dans des délais rapides afin de rendre le plus actuel possible les informations présentées dans cette revue.

### AIMS AND SCOPE

*Psychiatry & Psychobiology* presents the results of original research relative to those domains which are presently of interest to psychiatry: psychopathology, nosography, chemotherapy, psychotherapy, clinical methodology, biological disorders and mental pathology, psychophysiology, neuropsychology, as well as animal behavior.

This large scope, emphasizing, nevertheless, the publication of original articles, is meant to:

- 1) encourage the exchange of ideas and research within Europe,
  - 2) enable, within the international psychiatric community, an improved level of scientific communication.
- Short communications will be published rapidly in order to keep informations in this journal up-to-date.



### EDITIONS SCIENTIFIQUES ELSEVIER

29, rue Buffon, F-75005 Paris

Tél.: (1) 47.07.11.22 – Télex: 202400 F – Télécopie: (1) 43.36.80.93

### ABONNEMENTS/SUBSCRIPTIONS 1989 (Vol. 4)

Un an/annual subscription; 6 numéros/6 issues: FF 450 (France), FF 500 Autres pays (other countries).

Adresser ordre et paiement à /Address order and payment to: Editions Scientifiques Elsevier.

Banque/Bank: CCP Paris, N° 1904540 H.

– Les abonnements sont mis en service dans un délai de 4 semaines après réception du paiement. Ils partent du premier numéro de l'année/*Subscriptions begin 4 weeks after receipt of payment and start with the first issue of the calendar year.*

– Numéros de l'année et volumes antérieurs doivent être commandés à l'éditeur/*Back issues and volumes should be ordered from the publisher.*

– Les réclamations pour les numéros non reçus doivent parvenir dans un délai maximal de 3 mois après la parution/*Claims for missing issues should be made within three months of publication.*

– Les revues sont expédiées par avion, sans supplément, dans les pays suivants: D.O.M.-T.O.M., Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Comores, Congo, Côte-d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République Centrafricaine, Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie/*Journals are sent by SAL air delivery (Surface Airlifted Mail) to the following countries: South Africa, Argentina, Australia, Brazil, Canada, PR China, Hong Kong, India, Israel, Japan, South Korea, Malaysia, Mexico, Pakistan, Singapore, Taiwan, Thailand, USA, New Zealand.*

Tarifs aériens pour d'autres pays sur demande/*Airmail rates for other countries are available upon request.*

PUBLICITE/ADVERTISING: Editions Scientifiques Elsevier (P. Richard).

© 1989 Editions Scientifiques Elsevier, Paris

*Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.*

La loi du 11 mars 1957, n'autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d'autre part, que les analyses et courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » (alinéa 1<sup>er</sup> de l'article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

Imprimé en France par l'Imprimerie Saint-Paul, 55000 Bar-le-Duc  
Dépôt légal: décembre 1989. N° 11-89-1110

Le directeur de la publication: Alain Devanlay  
Commission paritaire: 68321  
Périodicité: 6 numéros/an

**Rédacteurs en chef :** P. BOYER, Paris/Sainte-Anne, J.D. GUELFU, Paris/Sainte-Anne, Y. LECRUBIER, Paris/Salpêtrière

**Rédacteurs associés**

*Psychopathologie*

J. ADES, Paris/Colombes  
H.S. AKISKAL, Memphis, TN  
J. DALERY, Lyon  
R. KLEIN-GITTELMAN, New York  
H. KATSNIG, Vienne  
R. LEVY, Londres  
H.G. POPE, Belmont, MA  
W. REIN, Tübingen

*Diagnostic et classification*

N. MOMBOUR, Munich  
C.B. PULL, Luxembourg  
N. SARTORIUS, Genève  
R.L. SPITZER, New-York

*Psychobiologie*

M. ACKENHEIL, Munich

P. BAUMANN, Lausanne  
J.-P. BOULENGER, Caen  
D. KEMALI, Naples  
P. LEMOINE, Lyon/Bron

*Psychothérapie*

A. BRACONNIER, Paris  
S. CONSOLI, Paris  
P. JEAMMET, Paris  
C. PERRIS, Umea  
I. MARKS, Londres

*Chimiothérapie*

G. CASSANO, Pise  
J.A. COSTA E SILVA, Rio de Janeiro  
D. GINESTET, Paris/Villejuif  
G. SEDVALL, Stockholm  
R. TAKAHASHI, Tokyo †  
A. VILLENEUVE, Beaufort/Québec

*Psychopharmacologie clinique*

J.M. DANION, Strasbourg  
S.Z. LANGER, Paris  
A.J. PUECH, Paris  
T.W. ROBBINS, Cambridge, U.K.

*Comportement animal et pharmacologie*

J. COSTENTIN, Rouen  
Ph. SOUBRIE, Montpellier

*Neuropsychologie*

M. de BONIS, Paris/Kremlin-Bicêtre  
J.A. GRAY, Londres

*Epidémiologie et Analyse des données*

J. FERMANIAN, Paris  
R. von FRENCKELL, Liège  
J. LELLOUCH, Paris/Villejuif  
J.P. LÉPINE, Paris  
F. ROUILLON, Paris/Colombes

**Comité scientifique**

N.C. ANDREASEN, Iowa City, IO  
M. ASBERG, Stockholm  
J.L. AYUSO, Madrid  
T.A. BAN, Nashville, TN  
P. BERNER, Vienne  
D. BOBON, Liège  
M. BOURGEOIS, Bordeaux  
M. CASAS, Barcelone  
J. COTTRAUX, Lyon  
R. DANTZER, Bordeaux

H. DUFOUR, Marseille  
A. FELINE, Paris/Kremlin-Bicêtre  
J. GLOWINSKI, Paris  
C. KORDON, Paris  
S. LEBOVICI, Paris  
M. LE MOAL, Bordeaux  
T. LEMPERIERE, Paris/Colombes  
J. H. LOO, Paris  
J.J. LOPEZ IBOR, Madrid

MENDLEWICZ, Bruxelles  
J. PELLET, Saint-Etienne  
P. PICHOT, Paris  
D. SCHALLING, Stockholm  
J.C. SCHWARTZ, Paris  
P. SIMON, Paris  
L. SINGER, Strasbourg  
D. WIDLOCHER, Paris  
E. ZARIFIAN, Caen

Une découverte

Dans le traitement des états anxio - dépressifs

# STABLON

12,5 mg

Tianeptine

## ■ 5 indications pour la pratique courante :


- troubles de l'humeur : états dépressifs névrotiques et réactionnels
- états anxio-dépressifs
- plaintes somatiques accompagnant les états dépressifs et anxieux
- états anxio-dépressifs du sujet âgé
- états anxio-dépressifs de l'alcoolique en période de sevrage : une indication qui a valeur de preuve

"L'activité de STABLON coordonnée sur les deux pôles dépressif et caractériel de l'alcoolique en sevrage, sans modifier l'état de vigilance des patients, représente un progrès thérapeutique et permet d'espérer une meilleure adhésion du malade à son traitement".  
(Dr. H. Grivois - Hôtel-Dieu, Paris - Rapport d'expertise)

## ■ Un fait à connaître : STABLON n'est jamais sédatif.

Stablon n'est ni sédatif, ni excitant, comme en témoignent :

- l'observation des malades traités
- et les contrôles électroencéphalographiques réalisés en cours de traitement.




## ■ Une découverte fondamentale : STABLON , stress et hippocampe.

STABLON accélère la vitesse de récupération (1) de cellules nerveuses particulièrement vulnérables au stress (2,3,4), les cellules pyramidales de l'hippocampe.

Ces cellules participent normalement à des fonctions comme la régulation de l'humeur, l'acquisition et la mise en mémoire des connaissances, et, de façon plus générale, l'adaptation d'un individu à une situation nouvelle ou imprévue.

1. Dresse A., Scuvee-Moreau J. - Clin. Neuropharmacol., 1988; 11 (suppl. 2) : S51-S58  
2. Mc Ewen B.S., Weiss J.M., Schwartz L. - Nature, 1968; 220 : 911-912  
3. Sapolsky R.M., Krey L.C., Mc Ewen B.S. - J. Neurosci., 1985; 5 (5) : 1222-1227  
4., Sapolsky R.M. - Brain Res., 1985; 359 : 300-305



**Forme et présentation :** Boîte de 30 comprimés enrobés de couleur blanche sous plaquette thermoformée (aluminium pvc). **Composition :** Tianeptine (sel de sodium) par comprimé 12,5 mg, par boîte 375 mg. Excipient qsp un comprimé enrobé terminé à 170 mg. **Propriétés pharmacologiques :** Antidépresseur. Les propriétés antidépressives de Stablon se distinguent de celles des imipraminiques. Stablon se caractérise par : - une activité sur les troubles de l'humeur qui le situe en position médiane dans la classification bipolaire entre les antidépresseurs sédatifs et les antidépresseurs stimulants, - une activité nette sur les plaintes somatiques, en particulier les plaintes digestives liées à l'anxiété et aux troubles de l'humeur, - une activité sur les troubles du caractère et du comportement de l'éthylrique en période de sevrage. Stablon est par ailleurs dépourvu d'effet : - sur le sommeil et la vigilance, - sur le système cardiovasculaire, - sur le système cholinergique (absence de manifestation anticholinergique), - toxicomogène. **Indications thérapeutiques :** - États dépressifs névrotiques et réactionnels, - États anxio-dépressifs avec plaintes somatiques en particulier digestives, - États anxio-dépressifs observés chez l'alcoolique en période de sevrage. **Contre-indications :** Enfants de moins de 15 ans, IMAO, grossesse, allaitement. **Précautions d'emploi :** Étant donné le risque suicidaire inhérent aux états dépressifs, les malades doivent être surveillés tout particulièrement en début de traitement. En cas d'anesthésie générale, il convient d'avertir l'anesthésiste-réanimateur et d'arrêter le traitement 24 ou 48 heures avant l'intervention. En cas d'urgence, l'intervention pourra être néanmoins réalisée sans interruption préalable, sous surveillance peropératoire. À l'arrêt du traitement, il est recommandé, comme avec tous les psychotropes de réduire la posologie pendant 7 à 14 jours. **Effets sur la capacité de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines :** Chez certains patients une baisse de la vigilance est susceptible de se manifester. L'attention est donc attirée sur les risques de somnolence attachés à l'emploi de ce médicament notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines. **Interactions médicamenteuses et autres interactions :** IMAO non sélectif. **Effets indésirables :** Rares, généralement bénins : - gastralgies, douleurs abdominales, bouche sèche, anorexie, nausées, vomissements, constipation, flatulences, - insomnie, somnolence, cauchemars, asthénie, - tachycardie, extrasystoles, précardialgies, - vertiges, céphalées, lipothymies, tremblements, bouffées de chaleur, - gêne respiratoire, boule dans la gorge, - myalgies, lombalgies. **Posologie et mode d'administration :** 1 comprimé de Stablon trois fois par jour, matin, midi et soir, au début des principaux repas. Chez l'alcoolique chronique, cirrhotique ou non, aucune modification posologique n'est nécessaire. Chez les sujets de plus de 70 ans et en cas d'insuffisance rénale, limiter la posologie à 2 comprimés par jour. C.T.J. de 5,18 F à 7,77 F. **Tableau A. AMM n°329.339.1. Prix : 77,70 F + 0,45 F S.H.P. Remb. Séc. Soc. 70 % Admis aux collectivités. Durée de stabilité : 3 ans. Pour une information plus complète consulter la fiche signalétique ou le dictionnaire des spécialités.** **STABLON 12,5 mg** est une marque déposée de la société **STABLON**, 25, rue Eugène Vignat, 45000 Orléans.

3 comprimés par jour



90 ST 20011

**Psychiatr. & Psychobiol. 4 (1989), No. 5**

The following papers were presented during the symposium "Epidemiology of affective and anxiety disorders" organized by Pr J. Angst at the 4th Congress of the European Association of Psychiatry (AEP) – Strasbourg 19-22 October 1988

Editorial	
L. Singer .....	255
Epidémiologie de l'anxiété dans la population générale française	
P. Pichot, D. Wildlöcher et J.C. Pull (Paris, France et Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg)	257
Anxiety and depressive disorders in a French population: methodology and preliminary results	
J.P. Lepine, J. Lellouch, A. Lovell, M. Teherani, C. Ha, M.H. Verdier-Taillefer, N. Rambourg and T. Lemperiere (Paris, Villejuif and Colombes, France) .....	267
Affective diseases – their course in a longitudinal perspective: the Lundby Study	
O. Hagnell (Lund, Sweden) .....	275
The epidemiology of affective disorders: national secular trends and local findings	
P.G. Surtees and S.P. Sashidharan (Edinburg and Birmingham, UK) .....	287
Anxiety and depression in an urban population: results of the Mannheim Cohort Study	
G. Reister and H. Schepank (Mannheim, FRG) .....	299
Results of the Zurich Cohort Study: course of anxiety and depression	
M. Vollrath and J. Angst (Zurich, Switzerland) .....	307
Comorbidity of anxiety disorders and depression: does it affect course and outcome?	
H.U. Wittchen and C.A. Essau (Munich, FRG) .....	315
<b>Revue de la littérature</b> .....	325
<b>Agenda</b> .....	327
<b>Recommandations aux auteurs</b> .....	332
<b>Instructions to authors</b> .....	333

Cité dans: Biological Abstracts; CNRS/Pascal; Excerpta Medica; Psychological Abstracts

CURRENT AWARENESS  
ABSTRACTS FROM  
EXCERPTA MEDICA

# Psychiatry

- MORE CURRENT THAN ~~ANY OTHER~~
- MORE INTERNATIONAL THAN ~~ANY OTHER~~
- MORE ABSTRACTS THAN ~~ANY OTHER~~
- DEEPER INDEXED THAN ~~ANY OTHER~~

Section 32  
Volumes 59-60  
(2 volumes in 20 issues)  
Price: Dfl. 1,230.00

**GET YOUR FREE  
SPECIMEN COPY NOW!**

Send your request to:  
EXCERPTA MEDICA  
ELSEVIER SCIENCE  
PUBLISHERS  
Attn: JAN JANSMA  
P.O. Box 1527  
1000 BM AMSTERDAM  
The Netherlands

Distributor in the U.S.A. and  
Canada:

Journal Information Center  
ELSEVIER SCIENCE  
PUBLISHERS  
655 Avenue of the Americas  
New York, N.Y. 10010

Yes, please send me a free specimen copy  
of Section 32

Name : \_\_\_\_\_

Address : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Post Code: \_\_\_\_\_

Country : \_\_\_\_\_